

ତୁଳସୀ

ତୁଳସୀ ର ବ୍ୟବସାୟିକ ଚାଷ ପ୍ରାୟ ଚୈଳଭୂପାଦନ ନିମନ୍ତେ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହାର ଚାଷ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁପରିମାଣରେ କରାଯାଉଅଛି । ଭାରତରେ ତୁଳସୀ ଗଛର ଧାର୍ମିକ ଓ ଔଷଧୀୟ ମହତ୍ତ୍ୱ ହେତୁ ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ନାମିତ । ବିଶ୍ୱରେ ୧୫୦ ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଜାତିର ତୁଳସୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କଳାତୁଳସୀ ର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଧିକ କାରଣ ଏଥିରେ ଅଧିକ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ରହିଥିବା ହେତୁ ପାରମ୍ପରିକ ଚିକିତ୍ସା ଓ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସାରେ ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଧିକ । ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାଶଔଷଧି, ସାବୁନ, ସାମ୍ପା ଓ ଜୁସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଅଛି , ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ତୁଳସୀରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ବଜାର ଚାହିଦା ରହିଅଛି । ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ଚାଷୀ ମାନେ ଏହାର ଚାଷ କରିଲେ ଅଧିକ ଉପକୃତ ହେବେ ।

ଚାଷ ପଣାଳୀ:

ଜଳବାୟୁ ଓ ମୂର୍ତ୍ତିକା:

ଏହାର ଚାଷ ନିମନ୍ତେ ଉଷ୍ଣକଟାବନ୍ଧିୟ ଓ କଟାବନ୍ଧିୟ ଜଳବାୟୁ ଉପଯୁକ୍ତ । ନିଚିତ୍ତା ବାଲିଆ-ଦୋରସା ମାଟିରେ ଏହା ଭଲ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ ।

ନର୍ସରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି:

ଏକ ହେକ୍ଟର ଜମି ଚାଷ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ଗ୍ରାମ ମଞ୍ଜି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ । ଏହାର ଚାରା ମଞ୍ଜି ମାଧ୍ୟମ ରେ କରାଯାଇଥାଏ । ଫେବୃଆରୀ ଓ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପଲିଥିନ ବ୍ୟାଗ ରେ ରୋପଣ କରାଯାଏ, ପରେ ସାମାନ୍ୟ ଜଳସେଚନ ଦରକାର । ପରେ ପରେ ଦିନକୁ ଦୁଇଥର ଜଳଛିଞ୍ଚନ କରିବା ଦରକାର । ପ୍ରାୟ ୨୦-୨୦ ଦିନମଧ୍ୟରେ ଚାରା ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟ କ୍ଷେତରେ ରୋପଣ ନିମନ୍ତେ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ।

ମୁଖ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି:

ତୁଳସୀ ର ଉତ୍ତମ ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ କ୍ଷେତ୍ର କୁ ଭଲଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ମେ ମାସରେ କ୍ଷେତ୍ର କୁ ୨-୩ ଓର ଗଭୀର ହଳ କରି ମାଟି ଖରା ଖାଇବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଦରକାର । ପ୍ରଥମ ବର୍ଷା ହେଲା ପରେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୧୫ ଟନ ଶଙ୍ଖା ଗୋବର ଖତ, ୧୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଜିଆଖତ ଓ ୪୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ପାଟଣ ମିଶାଇ ହଳ କରି ଜମି ସମତୁଳ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ ।

ଚାରା ରୋପଣ:

ଜୁଲାଇ ମାସ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ମୁଖ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାରା କୁ ଚାରା ରୋପଣ କରିବା ଉଚିତ । ଏହାର ରୋପଣ ଉପରବେଳା ସମୟରେ କରିଲେ ଚାରା ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ । ଚାରା କୁ ଚାରା ୪୦ ସେ.ମି. ଓ ଧାଡ଼ି କି ଧାଡ଼ି ୫୦ସେ.ମି. ଅନ୍ତରରେ ଚାରା ରୋପଣ କରିବାକୁ ହେବ । ରୋପଣ ପରେ ପରେ ଜଳ ଛିଞ୍ଚନ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଜରୁରୀ ।

ଜଳସେଚନ:

ଜଳସେଚନ କ୍ଷେତ୍ର ଆବୃତ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ସାଧାରଣତଃ ଖରାଦିନେ ମାସକୁ ୩ ଥର ଜଳସେଚନ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ ଓ ବର୍ଷ ଦିନରେ ଜଳସେଚନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଢ଼ିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଧାନ ଦେବା ଦରକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେପରି ପାଣି ଜମିକରି ନରୁହେ ।

ଘାସ ବାଛିବା:

ପ୍ରତି ୩୦ ଦିନରେ ଥରେ ଘାସ ଓ ଅନାବନା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସଫାକରିବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଧାନ ଦେବା ଦରକାର ଯେପରି ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ ଯେପରି ନଷ୍ଟ ନହୁଏ ।

ରୋଗ ଓ ପୋକ ନିରାକରଣ:

ଯଦି କୌଣସି ରୋଗ ଓ ପୋକ ଆକ୍ରମଣକରେ ତେବେ ଆମେ ଜୈବିକ କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ କାରଣ ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ କରିଲେ ତୁଳସୀ ର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ସହିତ ଏହାର ଚୈଳାଂଶ ମଧ୍ୟ କମିଯାଏ । ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ୧୦ ମି.ଲି. ନିମ୍ବତେଲ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ କିମ୍ବା ଚିତ୍ରକମୂଳ , ଧାତୁର ପତ୍ର ଗୋମୂତ୍ରରେ ମିଶାଇ ଏକ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହେବ । ଏହି ମିଶ୍ରଣ ୧୦ ମି. ଲି. ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରୋଗ ପୋକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ।

ଅମଳ:

ଫସଲରେ ଫୁଲ ଆସିଯାଏ ଏବଂ ତଳ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଝାଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ସେତେବେଳେ ଏହା ଅମଳ କ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ । ଚାରା ରୋପଣ ର ୯୦-୯୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତି ୨୫-୩୫ ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ପୁନଃ ଅମଳ କରାଯାଏ । ଏହା ୨ ୧/୨ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରତି ହେକ୍ଟରରେ ୨ ୧/୨ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୫ ଟନ ପତ୍ର ଅମଳ ହୋଇଥାଏ ।