

ଗୁଡୁଚି

ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିଚୟ:

ଆୟୁର୍ବେଦୀୟ ନାମ: ଅମୃତା, ଗୁଡୁଚି
ହିନ୍ଦୀ ନାମ: ଗିଲୟ
ଓଡ଼ିଆ ନାମ: ଗୁଡୁଚି

ବ୍ୟବହାର:

ଆୟୁର୍ବେଦ ମଉଳିକାୟା ଗୁଡୁଚି ମୁଖ୍ୟତଃ ଯକୃତ ଗତ ରୋଗ, ବୃକ୍କ ଜନିତ ରୋଗ, ବିଷମ ଜ୍ୱର, ଜ୍ୱର, ମଧୁମେହ ଓ ଗଣ୍ଡିବାତ ଆଦି ରୋଗରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଏହାର କାଣ୍ଡ କୁ ହିଁ ଔଷଧ ରୂପରେ ଉପଯୋଗ କରାଯାଏ ।

ଚାଷ ପଣାଳୀ:

ଜଳବାୟୁ ଓ ମୂର୍ତ୍ତିକା:

ଏହାର ଚାଷ ନିମନ୍ତେ ଉଷ୍ଣକଟୀବର୍ଣ୍ଣିୟ ଓ ଉପକଟୀବର୍ଣ୍ଣିୟ ଜଳବାୟୁ ରେ ଏହା ଭଲ ବଢ଼ିଥାଏ । ବାଲିଆ ଦୋରସା ମାଟି ଏବଂ ନିଗିଡ଼ା ଜମି ଏହାର ଚାଷ ନିମନ୍ତେ ଉପଯୁକ୍ତ ।

ନର୍ସରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି:

ଏକ ହେକ୍ଟର ଜମି ଚାଷ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟ ୨୫୦୦୦ ଚାରା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ । ଏହାର ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତି କାଣ୍ଡ ଓ ମଞ୍ଜି ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାର କାଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶୀଘ୍ର ଓ ସହଜରେ ହୋଇଥାଏ । ଫେବୃଆରୀ ଓ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ପେନସିଲ ମୋଟା ର ପୁରୁଣା ଗୁଡୁଚି କାଣ୍ଡ କୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏହାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ କାଟିବାକୁ ହେବ ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖଣ୍ଡରେ ୩-୪ ଗୋଟି ଗଣ୍ଡି ରହିଥିବା ଦରକାର କାରଣ ଏହି ଗାଣ୍ଡିରୁ ହିଁ କୁଅଁ ବାହାରିଥାଏ । ଏହି ଖଣ୍ଡକୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପଲିଥିନ ବ୍ୟାଗରେ ରୋପଣ ସମୟରେ ଧାନଦେବା ଦରକାର ଗୁଡୁଚି ଖଣ୍ଡର ନୀଚଭାଗ ମାଟି ଭିତରେ ରୋପିତ ହେବ ଦରକାର । କାଣ୍ଡ ରୋପଣ ପରେ ସାମାନ୍ୟ ଜଳସେଚନ ଦରକାର ପରେ ପରେ ଦିନକୁ ଦୁଇଥର ଜଳକ୍ଷିପ୍ତ କରିବା ଦରକାର । ପ୍ରାୟ ୪୫-୬୦ ଦିନମଧ୍ୟରେ ଚାରା ଗୁଡୁଚି ମୁଖ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୋପଣ ନିମନ୍ତେ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ।

ମୁଖ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି:

ଗୁଡୁଚି ଲତା ର ଉତ୍ତମ ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଭଲଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ମେ ମାସରେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ୨-୩ ଓର ଗଭୀର ହଳ କରି ମାଟି ଖରା ଖାଇବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଦରକାର । ପ୍ରଥମ ବର୍ଷା ହେଲା ପରେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୧୦ ଟନ ଶଙ୍ଖା ଗୋବର ଖତ ଓ ୧୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଜିଆଖତ ମିଶାଇ ହଳ କରି ଜମି ସମତୁଲ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ ।

ଚାରା ରୋପଣ:

ଜୁନ ଓ ଜୁଲାଇ ମାସ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ମୁଖ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାରାକୁ ଚାରା ୩ ମି. ଓ ଧାଡ଼ି କି ଧାଡ଼ି ୩ ମି. ଦୂରତ୍ୱରେ ଚାରା ରୋପଣ କରିବାକୁ ହେବ ।

ଜଳସେଚନ:

ଚାରା ରୋପଣ ପରେ ପରେ ସାମାନ୍ୟ ଜଳ ସେଚନ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ । ଯଦିଓ ବର୍ଷା ସମୟ ସମୟରେ ହେଉଥାଏ ତେବେ ଜଳସେଚନ ର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନଥାଏ । ବର୍ଷା ଠିକ ସମୟରେ ନହେଲେ ତାହେଲେ ୧୫-୨୦ ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ଜଳସେଚନ କରାଯାଏ ।

ଘାସ ବାଛିବା:

ପ୍ରତି ୩୦ ଦିନରେ ଥରେ ଘାସ ଓ ଅନାବନା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷେତରୁ ସଫାକରିବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଧାନ ଦେବା ଦରକାର ଯେପରି ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ ଯେପରି ନଷ୍ଟ ନହୁଏ ।

ରଞ୍ଜା ବ୍ୟବସ୍ଥା:

ଗୁଡୁଚି ଏକ ଆରୋହୀ ଲତା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ମାଡ଼ିବ ନିମନ୍ତେ ରଞ୍ଜା ଆବଶ୍ୟକ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାରା ମୂଳରେ କଞ୍ଚା ନିମ୍ବତାଳ ଆମ୍ବତାଳ ରଞ୍ଜା ଦିଆଯାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହା ବୃଦ୍ଧି ହେବ ସହିତ ଏହାର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ମଝିରେ ମଝିରେ ଧାନ ଦେବାକୁହେବ ଯେପରି ରଞ୍ଜାରେ ଓଇ ଲାଗି ଗଛକୁ ନଷ୍ଟନକରେ ।

ରୋଗ ଓ ପୋକ ନିରାକରଣ:

ଯେହେତୁ ଏହାର କାଣ୍ଡ ଓ ପତ୍ର ତିକ୍ତ ରସଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ରୋଗ ପୋକ ଲାଗିନଥାଏ ।

ଫସଲ ପରିପକ୍ୱତା ଓ ଅମଳ:

ଏହାର ଅମଳ ସମୟ ଜାଣିବା ଯେତେବେଳେ କାଣ୍ଡରୁ ପତ୍ର ଝଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହାର କାଣ୍ଡ ର ମୋଟେଇ ୨-୫ ସେଣ୍ଟିମିଟର ରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଏହା ଅମଳ ନିମନ୍ତେ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ଜମିଠାରୁ ୨-୩ ଫୁଟ ଉପରକୁ ଏହାକୁ କାଟି କରି ଅମଳ କରାଯାଏ । ତାହାପରେ ଏହି କାଣ୍ଡ କୁ ୧-୧.୫ ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବା ର ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ କାଟିକରି ଛାଇ ରେ ଏବଂ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ଗୃହରେ ଶୁଖାଯାଏ । ପ୍ରାୟ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୧୫୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ କଞ୍ଚା ଓ ୩୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଶୁଖିଲା ଗୁଡୁଚି ଅମଳ ହୋଇଥାଏ ।